○ Samoplátce ○ **STATIM**

Kód ZP: Datum a čas odběru: hh:mm

IČP: Odbornost:

Pacient:

Č. pojištěnce: / Muž ○ Žena ○

Datum narození: . .

Adresa:

Dg. hlavní: Dg. ostatní:

Terapie:

IFCOR KLINICKÉ LABORATOŘE

www.ifcor.cz

Studentská 812/6, 625 00 Brno
Zelená linka: 800 190 197
800 190 198

Seifertova 59, 586 01 Jihlava
Zelená linka: 800 190 196

Komenského 1, 763 21 Slavičín
Zelená linka: 800 199 888

Razítko a podpis

Žádanka na biochemické a hematologické laboratorní vyšetření

Jaterní blok + svaly
- ○ Bilirubin celkový
- ○ Bilirubin konjugovaný
- ○ ALT
- ○ AST
- ○ ALP
- ○ GGT
- ○ Kreatinkináza
- ○ Laktátdehydrogenáza

Pankreatický soubor
- ○ Alfa-amyláza
- ○ Amyláza pankreat.
- ○ Lipáza
- ○ Gastrin

Ledvinový soubor
- ○ Urea
- ○ Kreatinin
- ○ Kreatininová clearence
- ○ CKD - EPI (MDRD)
- ○ Kyselina močová
- ○ Aldosteron *2

Poloha při odběru:

- ○ Renin *4

Lipidový soubor
- ○ Cholesterol
- ○ Cholesterol-HDL
- ○ Cholesterol-LDL
- ○ Aterogenní index
- ○ Triacylglyceroly
- ○ Homocystein *6

Ionty a minerály
- ○ Hořčík
- ○ Vápník (celkový)
- ○ Hořčík ioniz. (výpočet)
- ○ Vápník ioniz. (výpočet)
- ○ Sodík
- ○ Draslík
- ○ Chloridy
- ○ Fosfor

Lékové hladiny
- ○ Valproát
- ○ Digoxin

Kardiální markery
- ○ Troponin
- ○ Myoglobin
- ○ BNP

Metabolismus železa
- ○ Železo
- ○ Transferin
- ○ Ferritin
- ○ Vitamín B12
- ○ Folát
- ○ Celková VK Fe (TIBC)

Metabolismus glukózy
- ○ Glukóza
- ○ Glyk. hemoglobin
- ○ o-GTT
- ○ IGF-1
- ○ IGFBP-3
- ○ C-peptid
- ○ Inzulin (IRI)
- ○ anti-GAD
- ○ anti-IA-2
- ○ ICA IgG, IgA
- ○ anti-inzulin IgG (IAA)
- ○ anti-ZnT8

Proteiny
- ○ Celková bílkovina
- ○ Albumin
- ○ CRP
- ○ ASLO
- ○ RF (screening)
- ○ IgG
- ○ IgA
- ○ IgM
- ○ IgE - celkové
- ○ IgG - podtřídy
- ○ IgG1
- ○ IgG2
- ○ IgG3
- ○ IgG4
- ○ IgA - podtřídy
- ○ IgA1
- ○ IgA2
- ○ ECP
- ○ alfa-1-antitrypsin
- ○ Haptoglobin
- ○ Orosomukoid
- ○ Prealbumin
- ○ C3
- ○ C4
- ○ ELFO bílkovin
- ○ Imunofixace
- ○ CIK - C1q

Štítná žláza
- ○ TSH
- ○ fT4 (volný T4)
- ○ fT3 (volný T3)
- ○ T4
- ○ T3
- ○ Tyreoglobulin
- ○ anti-TG
- ○ anti-TPO
- ○ anti-TSH receptor (TRAK)

Endokrinologie
- ○ 17-hydroxyprogesteron
- ○ hGH (růstový h., STH)
- ○ ACTH *1
- ○ Kortizol

Fertilita
- ○ hCG
- ○ Prolaktin
- ○ LH (lutropin)
- ○ FSH (folitropin)
- ○ Estradiol-17-beta
- ○ DHEAS
- ○ Progesteron
- ○ Testosteron
- ○ Free testosteron (přímo)
- ○ SHBG
- ○ FAI (free androgen ind.)
- ○ AMH *5, *5

Kostní metabolismus
- ○ Osteokalcin *6
- ○ Osteáza (kostní ALP)
- ○ P1NP
- ○ Crosslaps (CTx)
- ○ Parathormon (PTH) *6
- ○ 25-OH vitamín D

Tumormarkery
- ○ CEA
- ○ AFP
- ○ PSA
- ○ fPSA
- ○ [-2]proPSA *S,*5
- ○ CA 15-3
- ○ CA 19-9
- ○ CA 125
- ○ He4 (+ROMA) *S
- ○ CA 72-4
- ○ CA 50
- ○ TPA
- ○ hCG
- ○ beta-2-mikroglobulin
- ○ Kalcitonin *7

Virová hepatitida A
- ○ anti-HAV IgM
- ○ anti-HAV IgG

Virová hepatitida B
- ○ HBsAg
- ○ anti-HBs kvantitativně
- ○ anti-HBc IgM
- ○ anti-HBc celkové
- ○ HBeAg
- ○ anti-Hbe

Virová hepatitida C
- ○ anti-HCV celkové
- ○ anti-HCV Westernblot (konfirmace)

Virová hepatitida E
- ○ anti-HEV IgM, IgG ELISA

HIV
- ○ HIV 1/2 (Ab, Ag)

STOLICE
- ○ Stolice na OK

HEMATOLOGIE
- ○ Krevní obraz (KO)
- ○ KO+diff
- ○ Diff manuálně
- ○ Retikulocyty
- ○ Tromboplast test + INR+ Ratio
- ○ APTT + Ratio
- ○ Fibrinogen
- ○ D-dimery
- ○ Antitrombin
- ○ Sedimentace FW
- ○ Krevní skupina + Rh
- ○ Scr. nepr. protilátek

MOČ
- ○ Moč chemicky
- ○ Moč chemicky + sediment
- ○ Moč DIA

Analyty moče
- ○ Celková bílkovina + PCR
- ○ Urea
- ○ Glukóza
- ○ Amyláza
- ○ Kreatinin
- ○ Sodík
- ○ Draslík
- ○ Chloridy
- ○ Vápník
- ○ Fosfor
- ○ Horčík
- ○ Albumin + ACR
- ○ Kyselina močová
- ○ Kreatininová clearence
- ○ ELFO bílkovin
- ○ Kortizol
- ○ Aldosteron *3
- ○ NGAL (materiál MOČ)

Objem moči (ml):
Čas sběru (hodiny):
Výška (cm):
Těl. hmotnost (kg):

Drogový panel (moč)
- ○ THC, kokain, heroin, opiaty, extáze, amfetamin, TCA *samoplátci 250,- Kč*

Vysvětlivky

Standardní materiál pro vyšetření je krev/sérum, není-li uvedeno jinak.

1) Odběr do předchlazenýchch nádobek, po odběru uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.
2) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s EDTA. Nutno zaznamenat polohu pacienta při odběru – vzpřímená poloha, vleže na zádech.
3) Sbíraná moč za 24 hodin, stabilizace kyselinou boritou (na vyžádání v laboratoři).
4) Odběr do zkumavky s EDTA, při pokojové teplotě, nechladit, po případné separaci rychle zamrazit.
5) Primární zkumavku dopravit do laboratoře do 3 hodin nebo separovat sérum.
6) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s EDTA, uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.
7) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s heparinem, uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.

S Vyšetření pro samoplátce – cena na vyžádání v laboratoři.

Poznámky:

Barvy uvedené před vyšetřením korespondují s barvou víčka pro dané vyšetření u systémů BD a US Sarstedt.

Správně: ● Chybně: ✗ ✓

1 9 0 1 0 6 0 1